

①PPI/Ptab剤(内服剤)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1. 胃潰瘍(GU)	ランソプラゾールOD錠(小児はエソメプラゾールMg水和物のみ)	エソメプラゾールMg水和物Cp ポノプラザンフマル塩酸塩錠
2. 十二指腸潰瘍(DU)		
3. 逆流性食道炎		
4. 吻合部潰瘍		
5. Zollinger-Ellisons症候群		エソメプラゾールMg水和物Cp
6. 非びらん性胃食道逆流症		
7. 低アルピリン投与時のGU、DUの再発抑制 NSAIDs投与時におけるGU、DUの再発抑制		ランソプラゾールOD錠

なお、簡易懸濁不可かつ散剤での投与が必要な場合のみ、エソメプラゾールMg水和物懸濁用顆粒剤を使用。

②スタチン剤

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1. 高脂血症	プラバスタチンナトリウム錠	
2. 高コレステロール血症	ロスバスタチン錠(10歳以上の小児はピタバスタチン錠のみ適応)	ピタバスタチンカルシウム錠 アトルバスタチン錠
3. 家族性高コレステロール血症		

③フィブラート系高脂血症薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
高脂血症	ベザフィブラート徐放剤 フェノフィブラート錠	ベマフィブラート錠

④H2遮断内服薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1. 胃潰瘍・十二指腸潰瘍・逆流性食道炎	ファモチジン錠・OD錠 (散薬投与が必要な場合:ファモチジン散)	ラフチジン錠 ニザチジン錠
2. 胃炎・慢性胃炎の急性増悪の胃粘膜病変(びらん・出血・発赤・浮腫)の改善		
3. 吻合部潰瘍		ラフチジン錠
4. 上部消化管出血・Zollinger-Ellisons症候群		
5. 麻酔前投薬		

⑤尿酸生合成阻害薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1. 痛風	フェブキシostat錠 アロプリノール錠	トピロキシostat錠
2. 高尿酸血症		
3. がん化学療法に伴う高尿酸血症	フェブキシostat錠	

⑥降圧薬(ARB)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1. 高血圧	オルメサルタン錠・OD錠 テルミサルタン錠・OD錠 カンデサルタン錠・OD錠 (1歳以上の小児は、カンデサルタン錠・OD錠)	アジルサルタン錠
2. 腎実質性高血圧症	カンデサルタン錠・OD錠	
3. ACE阻害薬投与が適切でない慢性心不全		
4. 高血圧及び尿蛋白を伴う2型DMのDM性腎症	ロサルタンカリウム錠	

⑦降圧剤(ACE阻害剤)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1. (本態性)高血圧症	エナラプリルマレイン酸塩錠 (散剤投与が必要な場合:エ ナラプリルマレイン塩細粒 1%)	イミダプリル塩酸塩錠
2. 腎性高血圧症		ペリンドプリルエルブミン錠
3. 腎血管性高血圧症		イミダプリル塩酸塩錠
4. 悪性高血圧症		
5. 慢性心不全		
6. 糖尿病性腎症(I型)		

⑧ビスホスホネート製剤内服薬

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
骨粗鬆症	アレドロン酸錠35mg (週1回投与)	リセドロン酸Na錠17.5mg (週1回投与)

・錠剤での服用が困難な場合のみ、アレドロン酸経口ゼリー35mgを使用。

⑨糖尿病薬(α-グルコシダーゼ阻害薬)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
1. 糖尿病の食後過血糖の改善	ボグリボース錠・OD錠	ミグリトール錠・OD錠 アカルボース錠・OD錠
2. 耐糖能異常における2型糖尿病の発症抑制	ボグリボース錠・OD錠	

⑩糖尿病薬(グリニド系薬)

効能・効果	第一選択薬	第二選択薬
2型糖尿病	レオアグリニド錠 ミチグリニドCa・OD錠	ナテグリニド錠